3 $\boldsymbol{x}_{complete} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$

4 $\boldsymbol{x}_{complete} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$

5 Solvable if $2b_1 + b_2 = b_3$. Then $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 5b_1 - 2b_2 \\ b_2 - 2b_1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$

6 (a) Solvable if $b_2 = 2b_1$ and $3b_1 - 3b_3 + b_4 = 0$. Then $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 5b_1 - 2b_3 \\ b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$ (no free variables)

(b) Solvable if $b_2 = 2b_1$ and $3b_1 - 3b_3 + b_4 = 0$. Then $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 5b_1 - 2b_3 \\ b_3 - 2b_1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$

7 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & b_1 \\ 3 & 8 & 2 & b_2 \\ 2 & 4 & 0 & b_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_2 - 3b_1 \\ 0 & -2 & -2 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix} \rightarrow$ row 3 − 2 (row 2) + 4 (row 1) is the zero row $[0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; b_3 - 2b_2 + 4b_1]$

8 (a) Every $\boldsymbol{b}$ is in the column space: *independent rows*. (b) Need $b_3 = 2b_2$. Row 3−2 row 2 = 0.